

Biologie, Resistenzstatus und Bekämpfungsmöglichkeiten von Weidelgras-Durchwuchs im Ackerbau



Ewa Meinlschmidt, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Pflanzenschutz

Julius Kühn-Institut

Fachausschuss Pflanzenschutzmittelresistenz
- Herbizide -



Welsches Weidelgras
Deutsches Weidelgras

Lolium multiflorum | Lolium perenne

www.landwirtschaft.sachsen.de/
download/Weidelgraeser.pdf

Zur Frage der Bekämpfung von Weidelgras (Lolium spp.) mit chemischen und ackerbaulichen Maßnahmen in Raps und Getreide

On the question of ryegrass (Lolium spp.) control with chemical and agronomic measures in oilseed rape and cereals

Dominik Dicke*, Ewa Meinlschmidt*
*Regierungspräsidium Gießen, Pflanzenschutzdienst Hessen, Schwanfeldstraße 8, 35578 Wezlar
*Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Waldheimer Straße 219, 01683
Nossen
*dominik.dicke@rplg.hessen.de
DOI: 10.5073/jka.20xx.xxxx (Formatvorlage Address_Doi - wird redaktionell seitig bearbeitet)

Zusammenfassung
In Feldversuchen wurde die Wirksamkeit ausgewählter Herbizide mit Gräserwirkung gegen Weidelgras (Lolium spp.) in Wintererbsen geprüft. Darüber hinaus wurden Saatzeitversuche in Getreide angelegt, um den Einfluss des Saattermins auf die Weidelgrasdichte und Wirksamkeit der eingesetzten Herbizide in den Beständen zu testen. In Wintererbsen konnten vergleichsweise hohe Bekämpfungsleistungen mit dem Präparat Crawler (Wirkstoff Carbetamid) im 4-Blattstadium des Rapses erzielt werden. Wurde dieses Mittel im November (8-Blatt-Stadium des Rapses) eingesetzt war die Wirksamkeit geringer. Auch mit Kerb Flo ließ sich Weidelgras in Raps ab November im ersten Versuchsjahr gut bekämpfen. Bei einem starkem Auftreten von Weidelgras vor dem „Kerbttermin“ im November konnte das Weidelgras jedoch schon relevante Konkurrenz auf den Raps ausüben. Die Saatzeitversuche in Wintergetreide zeigten, dass eine Spätsaat zu einer erheblichen Reduktion der Weidelgrasdichte führte, sodass sich diese als empfehlenswerte ackerbauliche Maßnahme erwies. Aus den Untersuchungen sollen konkrete Beratungsempfehlungen abgeleitet werden.

Stichwörter: Herbizide, Saatzeitversuche

Abstract
Field trials were conducted to test the efficacy of selected herbicides with grass effect in winter oilseed rape against ryegrass (Lolium spp.). In addition, trials were set up in cereals to test the impact of seeding date on ryegrass density and efficacy of the used herbicides. In winter oilseed rape, comparatively high control efficacies were achieved with the product Crawler (active ingredient carbetamide) at the 4-leaf stage of oilseed rape. When this product was applied in November, the efficacy was considerably lower. Kerb Flo was also effective in controlling ryegrass in oilseed rape from November onwards. However, with a strong occurrence before the "Kerb date" in November, the present ryegrass could already exert relevant competition on the oilseed rape. The seeding date trials in winter cereals showed that late seeding led to a significant reduction in ryegrass density, so that



Betriebsreportage
STREIFENBEARBEITUNG IM OBERBRUCH:
WEITE FRUCHTFOLOGEN GEGEN TRESPEN

Pflanzenschutz
RESISTENTE WEIDELGRÄSER
SCHON IM HERBST BEKÄMPFEN

Langzeitversuche
MAIS PROFITIERT VON
ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN



sachsen.de

Sachsen Politik und Verwaltung Themen Service

Landwirtschaft

Pflanzenschutzversuche

Die vorliegenden Ergebnisse von Pflanzenschutzversuchen im Ackerbau sollen die sächsischen Landwirte bei der effektiven und umweltgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unterstützen. Die Daten sind detailliert in Form von Tabellen dargestellt. Die Pflanzenschutzversuche wurden mit folgenden Zielstellungen durchgeführt:

- Prüfung von Pflanzenschutzstrategien
- Prüfung der Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln unter Beachtung von Bekämpfungsrichtwerten und Prognosemodellen
- Prüfung von alternativen, nichtchemischen Verfahren
- Prüfung standort- und situationsbezogener Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln unter sächsischen Bedingungen
- Möglichkeiten und Grenzen der Reduzierung von Aufwandsmengen
- Vermeidung von Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel
- Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten von Schadorganismen
- Beitrag zur Schließung von Bekämpfungslücken
- Prüfung neuer Pflanzenschutzmittel, deren Zulassung erwartet wird.

Die Ergebnisse der Versuche sind eine wesentliche Grundlage für Empfehlungen und Informationen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie der Außenstellen zur umweltgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Versuchsberichte aus den Jahren 2006 bis 2018
Verweis zu www.isip.de

Ackerbau 2021 Ackerbau 2020

36 PFLANZENSCHUTZ



Resistenzuntersuchungen in der Gefäßkation des LR/LG Sachsen. Foto: Monique Bär

Tab. 1: Nachgewiesene Herbizidresistenzen in BB, SN, ST und TH

Pflanzentyp	Resistente Biotypen nach HRAC-Gruppe				Ank
	1	2	3	10	
Unkräuter	-	-	-	-	-
Ackerfruchtweizen	Chloridat, Cyflotol, Cyflotol, Fenoxaprop, Propaquizalop	Fluorfenoxon, Mesosulfuron, Mesosulfuron, Propaquizalop, Pyrimidol	Chloridat	-	ja
Weizen	Phoxaol, Propaquizalop	Fluorfenoxon, Mesosulfuron, Mesosulfuron, Propaquizalop, Pyrimidol	Chloridat	-	ja
Weizenarten	Phoxaol, Propaquizalop, Cyflotol	Fluorfenoxon, Mesosulfuron, Mesosulfuron, Propaquizalop, Pyrimidol	-	-	teils, meist ja
Getreide	-	Mesosulfuron	-	-	nein
Getreide	-	Fluorfenoxon, Mesosulfuron, Propaquizalop, Pyrimidol	-	-	nein
Getreide	-	Indoxacarb	-	-	nein
Getreide	-	Indoxacarb	-	-	nein
Getreide	-	Ameisensäure, Indoxacarb, Fenoxaprop, Indoxacarb	-	-	nein
Getreide	-	Indoxacarb	-	-	nein
Zwischengrubener Ackerbau	-	Indoxacarb, Mesosulfuron, Fenoxaprop, Indoxacarb	-	-	ja

her noch immer der Gemeine Windhalm. Vorwiegend werden Resistenzen gegen über der HRAC-Gruppe 2 ermittelt. Mindestens gegenüber der HRAC-Gruppe 5 treten einzelne oder in Verbindung mit ALS-Resistenzen auf. In den Jahren 2015 bis 2022 wurden von den Inspektoren 81 untersuchten Biotypen ca. 46 % als ALS-resistent eingeschätzt. 13 Biotypen reagierten mit deutlichen Minuswirkungen gegenüber der HRAC-Gruppe 5 (Isoproturon, Chloridat). Seit 2015

werden zunehmend einzelne Biotypen mit metaboличer Resistenz gegen ACC-Merkmale nachgewiesen. Betroffen ist insbesondere der Wirkstoff Phoxaol, bei starker Ausprägung wurde auch eine Kreuzresistenz mit Propaquizalop (z. B. Agli-S) beobachtet. Resistenter Ackerfruchtweizen ist bisher nur regional von Bedeutung. Die Anzahl der untersuchten Proben lag, auch bedingt durch die geringe Verbreitung, auf niedrigem Niveau von unter zehn Biotypen

Mit vereinten Kräften gegen resistente Ungräser

Die Pflanzenschutzdienste in vier Bundesländern untersuchen in einer gemeinsamen Strategie die Resistenzsituation in Schädigern im Getreideanbau. Im folgenden Text sind die Ergebnisse der letzten Jahre zusammengetragen.

Ewa Meinlschmidt, Christine Dämmer, Katrin Ewert, Dina Bergmann

In den Bundesländern Brandenburg (BB), Sachsen (SN), Sachsen-Anhalt (SA) und Thüringen (TH) gehört der Ackerfruchtweizen zu den wichtigsten Schafalunen. Die resistenzempfindlichen Phoxaol- und Propaquizalop-herbizide, insbesondere der Ackerfruchtweizen, nahmen in den letzten Jahren sowohl in der Verbreitung als auch in der Resistenzsituation zu. Die Bekämpfung vor allem resistenter Ungräser stellt Praktiker unter diesen Bedingungen vor schwer überwindbare Probleme. Neben der schrittweisen Modernisierung der Herbizidpaletten sind auch weitere wichtige Bausteine in der Unkrautkontrolle der Pflanzenschutzdienstleistungen zu erörtern.



4 6 8

Julius-Kühn-Archiv

Lena Ulber, Dagmar Rissel

Tagungsband
30. Deutsche Arbeitsbesprechung
über Fragen der
Unkrautbiologie und -bekämpfung
22. - 24. Februar 2022, online

Proceedings
30th German Conference on
Weed Biology and Weed Control
February 22-24, 2022, Braunschweig, online

Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland

2023

Eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

»Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland« am 7. Dezember 2023 in Klipphausen OT Groitzsch

Programm

09:00 Uhr	Begrüßung Klaus Wallrabe, LfULG
09:15 Uhr	Biologie, Resistenzstatus und Bekämpfungsmöglichkeiten von Weidelgras-Durchwuchs Dr. Ewa Meinlschmidt, LfULG
09:50 Uhr	Erfahrungen der Waldenburger Agrar GmbH mit der Bekämpfung von Weidelgras im Landkreis Zwickau Georg Stiegler, Waldenburger Agrar GmbH & Co. KG
10:15 Uhr	Aktuelles zum Pflanzenschutzrecht Ralf Dittrich, LfULG
10:40 Uhr	PAUSE
11:00 Uhr	Neue Trends bei Entscheidungshilfen zum integrierten Pflanzenschutz Dr. Michael Kraatz, LfULG
11:20 Uhr	Sind die vorgesehenen Restriktionen im Pflanzenschutz wissenschaftlich begründet und praktisch umsetzbar? Prof. Dr. sc. agr. Andreas von Tiedemann, Georg-August Universität Göttingen
12:45 Uhr	Schlusswort Andeja Thate, LfULG

Warum steigt die Bedeutung von Weidelgräsern als Unkraut?

Verbreitung und Biologie – Welsches Weidelgras

- Vermehrte Verwendung im Feldfutterbau, Dauergrünland, als Untersaat, als Bestandteil von Begrünungsmischungen
- Grassamenvermehrung (SN)
- Vorkommen in vielen Kulturen als Durchwuchs (Wintergetreide, Raps, Mais, Zuckerrüben)
- Es ist sehr umwelttolerant, Rasche und intensive Entwicklung
- Die Samen verbleiben fast bis zum Erntezeitpunkt an der Pflanze und gelangen somit in die Erntemaschinen
- Überbetrieblicher Einsatz von Mähdreschern (Samenverbreitung)



Welsches Weidelgras - Unterscheidungsmerkmale



Keimblatt gerollt
Triebgrund rötlich gefärbt



Blatthöhrchen übergreifend
Blatthäutchen 1-3 mm lang, weiß,
glattrandig
geriefte Blattoberseite
Blattunterseite glänzend

www.landwirtschaft.sachsen.de/download/Weidelgraeser.pdf



Blütenstand:
Ährchen mit der Schmalseite anliegend,
waagrecht abstehend (anders als bei Quecke)

Biologie von Weidelgras (*Lolium ssp*)

Welsches Weidelgras (*Lolium multiflorum*)

Standort	bevorzugt aber tiefgründige, warme, frische, mittelschwere und nährstoffreiche Böden unter günstigen Niederschlagsverhältnissen.
Keimung	ganzjährig möglich, 60 – 90 % keimen aus den oberen 3 – 5 cm Hohe Keimtemperatur (min. 10, opt. 15 °C Boden)
Samenlebensdauer im Boden	2 – 3 Jahre, max 5 Jahre
Dormanz (Samenruhe)	Vorhanden, aber kürzer als beim Ackerfuchsschwanz, bei Feuchtigkeit keimt ein Großteil der Samen bereits im Herbst
Vermehrung	Fremdbefruchter, hohe Pollenmenge und weiter Pollenflug bis 3 km, ermöglicht schnelle Auskreuzung und Verbreitung von (Resistenzgenen)
Samenpotenzial	Ca. 100 Samen/Ähre, 200 – 1500 Samen je Pflanze
Konkurrenzkraft	groß, schnellwüchsig 20 Pfl./m ² LOLMU → 50 % Ertragsverlust Weizen (Wintergetreide-Schadensschwelle: 8 Pfl./m ²)

Warum steigt die Bedeutung von Weidelgräsern als Unkraut?

Chemische Bekämpfung

- Wenige zugelassene Wirkstoffe stehen zur Verfügung
- Mit zunehmender Entwicklung (>BBCH 20-30) widerstandsfähig gegen eingesetzte Herbizide
- Sehr rasche Selektion von herbizidresistenten Biotypen
- Multiple Resistenzen (gegen mehrere Wirkmechanismen) sind sehr verbreitet



Foto: J. Oaks, LfULG

Starker Besatz von Weidelgras im Winterweizen,
Landkreis Zwickau, Frühjahr 2023



Fläche mit resistentem Weidelgras in Mittelsachsen

**Keine herbizide
Wirkung (Axial 50)**


**Einsatz von Flufenacet mit guter
Wirkung auf das Weidelgras**

Foto: J. Gohl, LfULG

Foto: M. Schindler, LfULG

Verbreitung von herbizidresistenten Weidelgräsern in Deutschland 2008-2023

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE







ACCase- oder ALS-Resistenz
Zumeist beides

Verdachtsmonitoring über Firma Syngenta,
keine Vollständigkeit und nicht repräsentativ
ausgewertet J. Petersen Hochschule Bingen

Untersuchung der Weidelgras-Verdachtsroben 2022


Biotest (Gewächshausprüfungen) des LfULG – Biotyp IV

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT
UND GEOLOGIE



Resistenzuntersuchungen in Sachsen 2023

Weidelgras - Standorte der Verdachtsproben (Samen) von 2023 für Biotest



	Biotyp I	Biotyp II	Biotyp III	Biotyp IV	Biotyp V	Biotyp VI
Herkunft	Erzgebirge sensitiv	Zwickau	Zwickau	Zwickau	Zwickau	Zwickau

	Biotyp VII	Biotyp VIII	Biotyp IX	Biotyp X	Biotyp XI	Biotyp XII
Herkunft	Sächs. Schweiz-Osterzg.	Bautzen	Zwickau	Zwickau	Mittelsachsen	Sächs. Schweiz-Osterzg


Untersuchung der Weidelgras-Verdachtsproben 2023

Biotest (Gewächshausprüfungen) des LfULG

			LOLMU												
Boniturergebnisse vom 02. November 2023			Probe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ort:	sensitiv											
			Gemeinde:												
Biotest D.A.T.			Landkreis:	ERZ	Zwickau					SS-OE	B	Zwickau		MS	SS-OE
HRAC-Gruppe	Herbizid	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	Wirkung in %												
1 / A	Axial 50	1,2	S	5	3	5	4	S	4	5	5	5	5	5	S
1 / A	Axial 50	2,4	S	5	2	3	4	S	2	5	5	5	5	5	S
2 / B	Atlantis Flex + Biopower	0,33 + 1,0	2	5	2	2	4	S	2	5	5	4	4	1	
2 / B	Atlantis Flex + Biopower	0,66 + 2,0	1	S	2	2	3	S	1	4	5	3	4	S	
2 / B	Maister Power	1,0	S	S	2	S	S	S	1	S	2	2	S	S	
2 / B	Maister Power	2,0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
1 / A / FOP	Agil-S	1,0	S	5	5	5	5	S	5	5	5	5	5	5	S
1 / A / FOP	Agil-S	2,0	S	5	5	5	5	S	5	5	5	5	5	5	S
1 / A / DIM	Focus Ultra + Dash E.C.	2,5 + 1,0	S	3	2	2	4	S	5	5	5	4	5	S	
1 / A / DIM	Focus Ultra + Dash E.C.	5,0 + 1,0	S	S	S	1	1	S	3	5	3	3	4	S	
15 / K3	Cadou SC	0,5	S	5	5	2	S	S	3	5	5	4	1	S	
15 / K3	Cadou SC	1,0	S	5	5	2	S	S	1	5	3	4	S	S	

Resistenzuntersuchungen in Sachsen 2019-2023

Verdachtsproben mit bestätigter Resistenz



Weidelgras / Biotest 2019-2023

- Anzahl der **Resistenz-Verdachtsproben** steigt
- deutliche Wirkungslücken zeigten sich in den Proben aus Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen.
- ACCase-Hemmer (z.B. Axial, Agil-S) und Avoxa (HRAC 1 und 2): nachgewiesene Resistenzen
- ALS-Hemmer (Atlantis WG, Atlantis Flex, Broadway): nachgewiesene Resistenzen
- Focus Ultra (ACCase-Hemmer): uch in einigen Proben unwirksam.
- multiple Resistenz gegen die Wirkstoffe der Gruppen ACCase- und ALS-Hemmer sowie gegen den Bodenwirkstoff Flufenacet (in Cadou SC)
- MaisTer - erste Resistenzen (in 4 Proben)


Weidelgras /molekulargenetische Untersuchungen

- gegenüber den ACCase-Hemmern - Wirkort-Resistenzen (Target-Site-Resistenzen, TSR), Mutationen Ileu 1781, Ileu 2041, Asp 2078
- Gegenüber ALS-Hemmern meistens metabolische Resistenzen

Wirkung von Herbiziden bei Frühjahrsanwendung gegen Weidelgras im Winterweizen

Feldversuche Sachsen und Hessen, 2016-2018

Anzahl der Weidelgrasähren in Unbehandelt kurz vor Ernte: 27-235 Ähren/m² oder 65% DG



Einfluss Saattermin Winterweizen

Einfluss unterschiedlicher Aussaattermine von Winterweizen auf den Besatz von Weidelgrasdurchwuchs

unbehandelte Kontrollen auf zwei nebeneinanderliegenden Winterweizenschlägen im Vergleich
2 Streulageversuche im Landkreis Zwickau, 4 Wiederholungen, Aufnahme: Juni 2021,



Frühsaat: 104 Ähren/m²




„Spättsaat“: 20 Ähren/m²
(Mittelwert von 4 Wiederholungen)

Fotos: M. Schindler, LfULG

Einfluss unterschiedlicher Aussattermine von Winterweizen auf den Auflauf von Weidelgrasdurchwuchs

Anzahl der Weidelgrasähren/m² kurz vor der Ernte in den unbehandelten Kontrollen


8 Feldversuche auf zwei nebeneinanderliegenden Winterweizenschlägen, Ernte 2019-2022, Landkreis Zwickau



Einfluss der unterschiedlichen Aussattermine von Winterweizen auf den Auflauf von Weidelgrasdurchwuchs und dessen Bekämpfung

8 Feldversuche Sachsen 2019-2022, Landkreis Zwickau

Weidelgras in unbehandelter Kontrolle kurz vor Ernte: Frühsaat 507 Ähren/m², Spätsaat: 52 Ähren/m²



Aufwandmengen in l/ha bzw. kg/ha;

* 2019 2,0 l/ha Carmina 640; ** 2021 3,0 l/ha Boxer

Frühjahrsbehandlungen erfolgten nur bei der Frühsaat. Im Jahr 2021 gab es auf Grund geringer Besatzdichte keine Nachbehandlungen.

Cadou SC, Carmina 640, Herold SC, Boxer und Trinity haben keine Indikation zur Weidelgrasbekämpfung. Im Rahmen einer Behandlung, z.B. gegen Ackerfuchsschwanz, Gemeinen Windhalm, Einjähriges Rispengras kann eine **Nebenwirkung** auf gleichzeitig vorhandene Weidelgräser erzielt werden.

Einfluss der unterschiedlichen Aussaattermine von Winterweizen auf den Besatz von Weidelgrasdurchwuchs

Cadou SC 0,5 l/ha + Carmina 640 2,5 l/ha im Vergleich,
2 Streulageversuche im Landkreis Zwickau, Auszählung Juni 2021



Frühsaat: 16 Ähren/m²



Spätsaat: 0,3 Ähren/m²
(Durchschnitt von 4 Wiederholungen)


Fotos: M. Schindler, LfULG

Empfehlungen zur chemischen Bekämpfung von Weidelgras im Wintergetreide im Herbst

Broschüre Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2023

- Anwendung von bodenaktiven Herbiziden (im Voraufbau) in Spritzfolge mit blattaktiven Herbiziden
- Wirkstoffgruppen (HRAC-Klassen) in der Behandlungsfolge regelmäßig wechseln


Herbizid	AWM (l o. kg/ha)	Getreideart					BBCH	AWB		Kosten (€/ha)
		G	W	R	T	Hang		Drainage Verbot		
Pontos + Quirinus	0,5 + 0,5	•	•	•	•	VA 10-12	5		53	
SF Herbst / Frühjahr: Pontos + Quirinus / Nachbehandlung im Frühjahr bei Bedarf	0,5 + 0,5 /	•	•	•	•	VA 10-12 / Frühjahr	5			
SF Herbst / Frühjahr: Quirinus + Lentipur 700 / Nachbehandlung im Frühjahr bei Bedarf	1,0 + 1,5 /	•	•	•		VA	20	ja		



Möglichkeiten zur Bekämpfung von Weidelgras im Wintergetreide im Frühjahr

Herbizid	AWM (l o. kg/ha)	Getreideart					AWB		Kosten (€/ha)
		G	W	R	T	bis BBCH	Hang	Drainage Verbot	
W.-Getreide: Nachbehandlung im Frühjahr (nach Anwendung bodenaktiver Herbizide im Herbst)									
Axial 50 ¹⁾	1,2	•	•	•	•	Veg.-beginn bis 39			50
Traxos ¹⁾	1,2		•	•	•	31			47
Avoxa ^{1) 2)}	1,35		•	•	•	32			41
Broadway ²⁾ + Netzmittel	0,275 + 1,0		•	•	•	30			71
Husar Plus ²⁾ + Mero	0,2 + 1,0		•	•	•	32		bis 15.03.	39
Atlantis Flex ²⁾ + Biopower	0,33 + 1,0		•		•	21 - 32	10	bis 15.03.	60
Incelo ²⁾ + Biopower + Husar OD ²⁾	0,3 + 1,0 + 0,1		•		•	20 - 32	20	bis 15.03.	87
S.-Getreide									
Axial 50 ¹⁾	1,2	•	•			39			50

¹⁾ nicht bei HRAC 1 Resistenz; ²⁾ nicht bei HRAC 2 Resistenz



Streulageversuch zur Bekämpfung von Weidelgras im Mais 2017 im Raum Döbeln


unbehandelte Kontrolle, Deckungsgrad Weidelgras 70 %

Foto: M. Schindler, LfULG

Wirkung von Herbiziden auf Weidelgras im Mais

3 Feldversuche 2016 - 2017, Sachsen und Hessen (n = 2 bis 3)

Deckungsgrad in unbehandelten Kontrollen: SN: 70 %, HE: 18 Pfl./m²





0,33 kg/ha Arigo + 0,3 l/ha Trend + 2,0 l/ha Spectrum Gold
Wirkungsgrad: 20 %



0,09 kg/ha Principal + 0,3 l/ha Trend + 3,0 l/ha Succesor T

60 % WG (4 Mittelwert aus Wiederholungen)




**1,5 l/ha MaisTer power (Iodosulfuron, Foramsulfuron, Thiencarbazone)
+ 1,5 l/ha Aspect (Flufenacet, TBA)
Wirkungsgrad: 98 %**

Versuchsfläche 2023, Winterraps, Landkreis Zwickau

Wirkung von bodenaktiven Herbiziden solo und als Spritzfolge sowie von blattaktiven Tankmischungen auf Weidelgras im Winterraps

Feldversuch auf dem Resistenzstandort, Sachsen, Landkreis Zwickau, 2023

Weidelgras-Deckungsgrad in Unbehandelt (Mittelwert von 4 Wiederholungen) am 02.05.2023 von 30%





Resistentes Weidelgras in der unbehandelten Kontrolle,
Feldversuch 2023, Landkreis Zwickau



Spritzfolge 2,5 l/ha Butisan Kombi im VA / NovaKerb* 1,0 l/ha
im November 2022

*NovaKerb (Propyzamid, Halauxifen-methyl): Weiterentwicklung von Kerb flo

Weidelgras - Management

- Ackerbauliche Maßnahmen sollen integriert werden, z.B.
 - Weitere Fruchtfolgen
 - Winterraps
 - Sommergerste
 - Mais
 - Mehrfache Stoppelbearbeitung (Witterung!)
 - Altpflanzen zerstören
 - Grundbodenbearbeitung (Pflugfurche), einmal in der Fruchtfolge
 - Samenpotenzial vergraben
 - Falsches Saatbett? (keine Versuchsergebnisse)
 - Spätere Aussattermine von Wintergetreide
- Feldhygiene
 - Reinigung von Mähdrescher vor dem Umsetzen auf benachbarte Felder
 - Kein Weidelgras in Begrünungen (Samenbildung!)




Folge von starken Niederschlägen im März/April 2023
Aufnahme am 20.04.2023

Prüfung auf Herbizidresistenzen in unterschiedlichen Herkünften von Welschem Weidelgras (HB96-213850-2019_No) gegenüber blattaktiven Herbiziden

- Durchführung eines Ringversuch mit Beteiligung des Bundeslandes Hessen
- Es kommen gegen Weidelgras wirksame Herbizide in Getreide, Raps, Zuckerrüben zum Einsatz
- Die Festlegung der Behandlungen erfolgte gemeinsam mit dem Pflanzenschutzdienst Hessen
- Bei ungenügenden Wirkungsgraden wird von einer Resistenz beim Saatgut ausgegangen
- Anlage einer Versuchsanlage auf dem Pflanzenschutzprüffeld in Nossen
- Auswahl von 24 Herkünften von Welschem Weidelgras
- eine unbehandelte Kontrollparzelle pro Sorte
- Auswahl von 3 Herbstbehandlungen Atlantis WG + FHS, Axial 50, Agil S Select 240 SC und eine Frühjahrsbehandlung Broadway + BNM

Zusammenfassung:

24 geprüften Herkünfte wurden als unauffällig gegen Resistenz eingestuft.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

